


РЕКОМЕНДОВАНО
школьным методическим объединением
учителей начальных классов
ГАОУ СО «Гимназия № 1»
протокол № 4 от «30» марта 2023 г.
Руководитель МО
 /Игнашова Елена Михайловна/

Окружающий мир 2 класс



Автор: Аникина Наталья Александровна,
учитель начальных классов ГАОУ СО «Гимназия № 1»
г. Саратов



A vibrant spring-themed illustration. On the left, a brown and white bird perches on a branch with large green leaves and white flowers. Several colorful butterflies (orange, blue, yellow) are scattered throughout the scene. On the right, a green vine with heart-shaped leaves and a cluster of red and orange flowers are visible. The background is a light blue sky with soft white clouds. In the center, a rectangular frame with a checkered pattern contains the text.

*Весна в
мире
насекомых.*



Существует более миллиона различных видов насекомых. Они живут повсюду, за исключением морских глубин. У многих из них шесть ног, пара усиков, одна-две пары крыльев и тело, состоящее из трех частей.



Кто это?



Муравей



VESHYIY_OLEG

- Много опасных насекомых поедают муравьи. Недаром их называют «санитарами леса».

Пчела



- Пчела делает 200 взмахов крыльями в секунду. За день опыляет до 7.000 цветков. Для сбора 1 кг мёда одной пчеле нужно налетать около 300.000 км и посетить 19 млн. цветков.

Стрекоза



- Стрекоз называют «воздушные» хищники. За час одна стрекоза может съесть 40 комнатных мух и тут же начнет еще гоняться за комарами и другими насекомыми.

Муха



- Лишь некоторые виды мух кусаются и переносят инфекции. Мухи опыляют растения, а их личинки пожирают клопов и гусениц.

Шмель



- Ранней весной (конец апреля – май) матка в одиночку начинает устраивать гнездо. Яйцо развивается около 4 дней, а взрослые шмели выходят из коконов на 22 – 23 день.

Лимонница



Опубликовано на MirBukashek.ru

- Лимонница появляется при первых весенних лучах солнца. Её считают бабочкой – долгожительницей, она может прожить до 13 месяцев. Гусеницы питаются листьями крушины, а бабочки проводят лето, питаясь нектаром.

Крапивница



- Крапивницу можно встретить везде, где есть крапива. Появляется ранней весной и летает все лето. Гусеница буроватого цвета с шипами, питается крапивой.

Адмирал



- Гусеницы могут быть чёрными, зелёными или жёлто-коричневыми, все они имеют одиночную жёлтую полосу. Питается эта бабочка крапивой и чертополохом.

Траурница



Обитает на опушках леса, в садах и парках. Питается листьями берёзы, осины, соком поврежденных деревьев и перезрелыми фруктами.

Дневной павлиний глаз



- Гусениц этой бабочки никогда не бывает много. Так что вреда они не приносят, да и живут часто на сорных растениях.

Капустница



Гусеницы
бабочки –
капустницы
питаются капустой.
Птицы их не
трогают. Если
гусениц много,
они могут погубить
почти весь урожай.

Комар



- Комары существуют на всех континентах, кроме Антарктиды. В России можно встретить около 100 видов комаров. Личинки комаров питаются в водной среде и не истощают почвы.


Самое большое насекомое – бабочка с Соломоновых островов.
Размах ее крыльев около 30 см.




А самое маленькое насекомое – жук-трихоптерикс. Его длина равна всего лишь третьей части миллиметра. И у такой малютки есть мозг, сердце, органы дыхания, кишечник!




Какая польза от комаров?




Какая польза от комаров?



Какая польза от личинок комаров?



Какая польза от личинок комаров?



Информационные ресурсы

- Окружающий мир. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Ч.2/А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. М.: Прсвещение, 2019.-127 с.
- images.yandex.ru
- <http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=351474343-04-72&n>
- <http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=29984456-53-72&n=21>
- <http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=8333207-62-72&n=21>